

**IUMSP**

Institut universitaire de médecine sociale et préventive, Lausanne



# Enquête sur la fumée de tabac en Suisse

Enquête conduite pour

**Institut Universitaire de Médecine  
Sociale et Préventive (IUMSP)  
Lausanne**

**Présentation des résultats**

Berne, 2 décembre 2005  
S. 05121/C

# Introduction

DOXA a été chargée par l'IUMSP - Institut Universitaire de Médecine Sociale et Préventive Lausanne - de relever auprès d'un échantillon représentatif de la population Suisse :

- **la prévalence des fumeurs/fumeuses** dans la population Suisse adulte
- **certaines habitudes des fumeurs/fumeuses** (combien de cigarettes par jour, tentatives concrètes pour arrêter de fumer, lieux d'achat, etc.)
- **les opinions des Suisses (fumeurs et non) sur certains sujets liés à la fumée** (l'augmentation du prix du paquet de cigarettes pour réduire la diffusion de la fumée chez les jeunes, l'interdiction de fumer dans les locaux publics et dans les lieux publics, etc.).

# Méthodologie

Pour cette enquête ont été conduites **2.000** interviews auprès d'un échantillon représentatif de la population suisse adulte (entre 15 et 74 ans).

Les interviews ont été effectuées avec CATI (Computer Assisted Telephone Interview) par l'institut Publitest de Zürich, sous la coordination de l'institut Doxa de Milan.

Le relevé a eu lieu au mois de **septembre 2005**.

Les foyers contactés ont été tirés au sort de façon aléatoire du fichier des abonnés au téléphone.

La personne à interroger a été choisie par la méthode des quotas.

En particulier, on a utilisé des quotas pour :

- région
- sexe
- âge

Avec un échantillon de 2000 cas, l'erreur statistique est de +/- 3%.

# Structure de l'échantillon

échantillon total  
(2.000)  
(%)

## Régions

à Suisse Italienne (Canton Tessin)	4.5
à Suisse Romande	23.4
à Suisse Alémanique	72.1

## Sexe

à Hommes	47.7
à Femmes	52.3

## Age

à 15-24 ans	19.6
à 25-54 ans	54.1
à 55-74 ans	26.3

**IUMSP**

Institut universitaire de médecine sociale et préventive, Lausanne



# LES RESULTATS PRINCIPAUX

# Répartition en pourcentage de l'échantillon selon l'habitude à la fumée


(Analyse selon le sexe)

q. 1

	Total (2.000) %	Hommes (955) %	Femmes (1.045) %
Base: tous les adultes			
● Non fumeurs/fumeuses	58.6	54.1	62.7
● Ex-fumeurs/fumeuses	19.1	22.3	16.2
● <b>Fumeurs/fumeuses de cigarettes</b>	<b>22.3</b>	<b>23.6</b>	<b>21.1</b>
dont:			
. moins de 15 cigarettes par jour	9.5	8.2	10.6
. 15-24 cigarettes par jour	9.2	10.4	8.0
. 25 et plus cigarettes par jour	3.6	5.0	2.5

# Fumeurs de cigarettes parmi les hommes et les femmes dans les différentes classes d'âge

q. 1



# Consommation moyenne de cigarettes par jour (Analyse sur les fumeurs, selon l'âge)

q. 4b

	Total	15-24 ans	25-44 ans	45-64 ans	65-74 ans
<i>Base: fumeurs</i>	(446)	(93*)	(181)	(140)	(32*)
	%	%	%	%	%
◆ Moins de 5 cigarettes par jour	12.3	17.2	11.6	10.7	9.4
◆ De 5 à 9 cigarettes par jour	12.1	17.2	13.8	7.9	6.3
◆ De 10 à 14 cigarettes par jour	17.3	18.3	15.5	20.7	9.4
◆ De 15 à 19 cigarettes par jour	9.6	14.0	9.4	6.4	12.5
◆ De 20 à 24 cigarettes par jour	21.3	14.0	24.9	19.3	31.3
◆ 25 et plus cigarettes par jour	13.7	7.5	8.8	24.3	12.5
<b>CONSOMMATION MOYENNE PAR JOUR</b>	<b>13.6</b>	<b>10.7</b>	<b>12.1</b>	<b>17.4</b>	<b>13.9</b>

\*base petite

# A quel âge commence-t-on à fumer?

(Analyse selon le sexe)


q. 2

<i>Base: fumeurs et ex-fumeurs</i>	<b>Total</b> (828) %	<b>Hommes</b> (438) %	<b>Femmes</b> (390) %
● <b>Moins de 15 ans</b>	<b>12.9</b>	<b>13.5</b>	<b>12.3</b>
● <b>De 15 à 17 ans</b>	<b>39.9</b>	<b>35.6</b>	<b>44.6</b>
● <b>De 18 à 20 ans</b>	<b>34.8</b>	<b>39.5</b>	<b>29.5</b>
● <b>Plus de 20 ans</b>	<b>12.0</b>	<b>10.5</b>	<b>13.6</b>
<b>AGE MOYEN</b>	<b>18.0</b>	<b>17.9</b>	<b>18.1</b>

# Les tentatives concrètes pour arrêter de fumer (Analyse selon le sexe)

Base: fumeurs

q. 5



# Dans quelle mesure l'augmentation d'un franc du prix du paquet des cigarettes pourrait réduire la diffusion de la fumée chez les jeunes?

q. 6

<i>Base: tous les adultes</i>	<b>Total (2.000) %</b>
● <b>Beaucoup</b>	<b>7,9</b>
● <b>En partie (modérément)</b>	<b>27,7</b>
● <b>Peu</b>	<b>31,3</b>
● <b>Pas du tout</b>	<b>32,3</b>
● <b>aucune réponse</b>	<b>0,8</b>

**Répartition des achats de cigarettes effectués au cours du dernier mois:**

● magasins de tabac/journaux (kiosques)	50.5%
● supermarchés/grandes surfaces	33.0%
● distributeurs automatiques	6.7%
● sur Internet	0.1%
● autres lieux/occasions	8.6%
● cigarettes offertes	1.1%

Base: fumeurs (446)

# L'interdiction de fumer dans les locaux publics

q. 7a

Parlons maintenant de l'interdiction de fumer dans les **locaux publics**, comme les cafés, les restaurants, etc. Êtes-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt contre ou totalement contre une interdiction de fumer dans les locaux publics?

✿ tout à fait favorable	36.1%	✿ Total favorables = 64.1%
✿ plutôt favorable	28.0%	
✿ plutôt contre	24.3%	
✿ totalement contre	10.2%	
✿ aucune opinion	1.4%	

Base: tous les adultes

# L'interdiction de fumer dans les locaux publics

*(Analyse selon l'habitude à la fumée)*

q. 7a

	Total (2.000) %	Fumeurs (446) %	Ex fumeurs (382) %	Non fumeurs (1.172) %
• Tout à fait favorable	36.1	14.1	37.2	44.1
• Plutôt favorable	28.0	20.0	31.2	30.0
<b>Total favorables</b>	<b>64.1</b>	<b>34.1</b>	<b>68.4</b>	<b>74.1</b>
• Plutôt contre	24.3	39.0	20.9	19.7
• Totalemment contre	10.2	26.2	9.4	4.4
• Aucune opinion	1.4	0.7	1.3	1.8

# L'interdiction de fumer dans les lieux publics

q. 7b

La fumée de tabac est interdite dans certains **lieux publics** (bureaux de poste, hôpitaux, etc). Êtes-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt contre ou totalement contre l'extension de l'interdiction de fumer à tous les autres lieux publics fermés?

✿ tout à fait favorable	47.6%	✿ <b>Total favorables = 76.8%</b>
✿ plutôt favorable	29.2%	
✿ plutôt contre	17.2%	
✿ totalement contre	5.3%	
✿ aucune opinion	0.7%	

Base: tous les adultes

# L'interdiction de fumer dans les lieux publics

(Analyse selon l'habitude à la fumée)

q. 7b

	Total (2.000) %	Fumeurs (446) %	Ex Fumeurs (382) %	Non Fumeurs (1.172) %
• Tout à fait favorable	47.6	30.0	51.9	52.9
• Plutôt favorable	29.2	31.9	27.7	28.7
<b>Total favorables</b>	<b>76.8</b>	<b>61.9</b>	<b>79.6</b>	<b>81.6</b>
• Plutôt contre	17.2	24.2	15.2	15.2
• Totalement contre	5.3	13.5	4.7	2.3
• Aucune opinion	0.7	0.4	0.5	0.9

# L'interdiction de fumer dans les lieux de travail

q. 8

Parlons maintenant de la fumée de tabac dans les **lieux de travail** publics et privés. À l'heure actuelle, dans certaines entreprises il est interdit de fumer en dehors d'espaces réservés. Êtes-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt contre ou totalement contre le fait que l'interdiction de fumer soit étendue à l'ensemble des entreprises ?

☀ tout à fait favorable	35.0%	☀ Total favorables = 62.2%
☀ plutôt favorable	27.2%	
☀ plutôt contre	25.5%	
☀ totalement contre	11.3%	
☀ aucune opinion	1.0%	

Base: tous les adultes

# L'interdiction de fumer dans les lieux de travail publics et privés (Analyse selon l'habitude à la fumée)

q. 8

	Total (2.000) %	Fumeurs (446) %	Ex Fumeurs (382) %	Non Fumeurs (1.172) %
◆ Tout à fait favorable	35.0	23.5	38.0	38.5
◆ Plutôt favorable	27.2	26.0	24.6	28.6
<b>Total favorables</b>	<b>62.2</b>	<b>49.5</b>	<b>62.6</b>	<b>67.1</b>
◆ Plutôt contre	25.5	30.7	25.9	23.3
◆ Totalement contre	11.3	19.1	11.0	8.4
◆ Aucune opinion	1.0	0.7	0.5	1.2

# IUMSP

Institut universitaire de médecine sociale et préventive, Lausanne



**MERCI DE VOTRE ATTENTION !**